

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

12枚入 (14cmx10cm)
第2類医薬品

サンポー 経皮吸収型消炎・鎮痛剤 インドメタシンシップ EX

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分により過敏症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください

🗨 **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

製造番号

使用期限

紙箱



特 長

1. インドメタシン1.0%配合

主成分のインドメタシンが、直接患部に浸透し、関節痛・筋肉痛などの症状を改善します。

2. うす型で伸縮自在 さわやかな使用感

シップ剤がはがれやすいひじやひざ等の関節部位にもピッタリフィットします。

3. 保湿ファスナー付

中袋には、便利な保湿ファスナーが付いていて、シップ剤の乾燥を防ぎます。

成分・分量

膏体100g中 インドメタシン……………1.0g
添加物として、l-メントール、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースナトリウム、エト酸Na水和物、チオ硫酸Na水和物、N-メチル-2-ピロリドン、酒石酸を含有します

効能・効果

関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘等)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量

・プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼ってください。
・15歳未満の小児は使用しないでください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。
- (2) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (3) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開口部のファスナーを閉めて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

※帯状疱疹 本剤の使用中に痛みとともなう赤みを帯びた米粒大の水疱があらわれた場合には、ウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止し、皮膚科専門医の診療を受けてください。

三宝製薬㈱(お客様相談室)
電話 03-3952-0100
月～金曜日(9:00～17:00)(祝祭日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

発売元 三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18

製造販売元 TOKYO 東光薬品工業株式会社
東京都定立区新田2-16-23

開口

実物大サイズ