

2012年9月 改訂 (記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

## 皮膚軟化薬

第3類医薬品

# ウイスベール20CE

手指がカサカサする、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしが固くコチコチになる、水仕事などで肌がザラザラするといった症状は、皮膚表面の角質層の水分不足が原因です。

ウイスベール20CEは、角質水分保有力増強作用のある尿素20%に、消炎作用のあるグリチルレチン酸を配合したクリームです。「カサカサ」「コチコチ」「ザラザラ」の皮膚を改善します。

### 〈ウイスベール20CEの特徴〉

- 20%の尿素が、体内から角質層へ適度の水分を取り込み、皮膚の水分バランスを保ちます。
- 親水性のクリーム剤ですので水で洗い流せます。

### ⚠ 使用上の注意

#### してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
次の部位には使用しないで下さい

- 目の周囲、粘膜等。
- 引っかき傷の傷口、亀裂(ひびわれ)部位。
- かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- 炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。

#### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬や化粧品などにより刺激症状又はアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ひりひり感)、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態等

- 2週間使用しても症状がよくなる場合は

使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

#### 効能・効果

手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

#### 用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗擦して下さい。
- 〈用法・用量に関連する注意〉
- 用法・用量を厳守して下さい。
  - 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
  - 小児(15歳未満)には使用させないで下さい。
  - 本剤は外用にのみ使用して下さい。
  - 化粧品ではないので、効能・効果で定められた患部のみで使用し、基礎化粧品などの目的で顔面には使用しないで下さい。
  - 患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。

#### 成分・分量

100g中	
成分	分量
尿素	20.0g
グリチルレチン酸	0.3g

添加物として、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、ステアリン酸ソルビタン、

セタノール、流動パラフィン、スクワラン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、パラベン、香料、その他4成分を含有します。

#### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室  
☎ 0120-468771  
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **協和薬品工業株式会社**  
営業本部：岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**  
富山県中新川郡上市町三日市22番地