

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈にきび・吹き出物治療薬〉

モアファイン アクネ

第2類医薬品

- お肌にやさしい弱酸性のクリームです。
- のびがよくベタつかないクリームです。
- 2つの有効成分が、にきび・吹き出物を効果的に治療します。

①イブプロフェンピコノール (IPPN)

アクネ菌によるコメドの生成を抑え、炎症をしずめます。


②イソプロピルメチルフェノール (IPMP)

症状を悪化させるアクネ菌などを殺菌します。

①正常な皮膚




②にきび・吹き出物のはじまり



IPPNがコメドの生成を抑制
IPMPがアクネ菌などを殺菌

③にきび・吹き出物



IPPNが炎症をしずめる

コメド=毛穴に皮脂や角質がつまった状態



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の部位には使用しないでください

目や目の周囲



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)患部が広範囲の人。
(4)湿潤やただれのひどい人。
(5)深い傷やひどいやけどの人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(ヒリヒリ感)、はれ(腫脹)、乾燥化(つっぱり感)

3. 1ヶ月位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面もお読みください。

【効能・効果】

にきび、吹き出物

【用法・用量】

1日数回、石けんで洗顔後、適量を患部に塗布してください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤はにきび・吹き出物のある部位のみに使用し、周辺の広い部分には使用しないでください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (5)本剤は外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
イブプロフェンピコノール	3.0g	アクネ菌によるコメドの成長を抑えるとともに、にきびの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.3g	殺菌効果があります。

添加物として、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、チオ硫酸ナトリウム水和物、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、オクチルドデカノールを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：協和薬品工業株式会社 お客様相談室

☎058-246-8771

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **協和薬品工業株式会社**
岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号