

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

漢方製剤

神農当帰芍薬散料エキス錠

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能〕

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

〔用法・用量〕

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
7才以上 15才未満	3錠	
5才以上 7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2~3時間を持します。

〔成分・分量〕

12錠中

当帰芍薬散エキス（1／2量）2.30gを含有しています。

日局トウキ	1.5g	日局センキュウ	1.5g
日局シャクヤク	2.0g	日局ブクリョウ	2.0g
日局ソウジュツ	2.0g	日局タクシャ	2.0g

上記生薬量に相当します

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸A1、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物を含有しています。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 吸湿しやすいため、服用のつど瓶のフタをよくしめてください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根本皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります、効能にはかわりありません。
- (6) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じことがあります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

神農製薬 お客様相談室

電話 045(593)5738

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 神農製薬株式会社

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台 196-1