

ご使用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

貼り薬

タミトールパスN1 (E判)

第3類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによるアレルギー症状を起したことがある人
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

肩こり・腰痛・筋肉痛・筋肉疲労・関節痛・打撲・捻挫・しもやけ・骨折痛

用法・用量

- 1日1～2回ライナーをはがし、患部にはってください。
(用法及び用量に関連するご注意)
- (1) 用法及び用量を厳守してください。
 - (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
 - (4) 皮ふのとくに弱い人は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
 - (5) 皮膚の弱い人は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
 - (6) 貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。

成分・分量

1. 0㎡中（膏体193.53g当たり）

d1-カンフル	1.8g
1-メントール	4.5g
サリチル酸メチル	9.0g
ハッカ油	1.2g
トコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）	0.5g
ノニル酸ワニルアミド	0.01g

添加物としてポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸Ca、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシルコポリマー、ゴムラテックス、赤色405号、黄色205号、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

問合せ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

：大阪市北区天満3丁目6番1号

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元：株式会社廣昌堂

：富山県射水市水戸田2841