

服用に際して、この文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ビタミン含有保健薬

ネオゼネル液－B

第2類医薬品

使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	皮膚
症状	発疹・発赤、かゆみ
関係部位	消化器
症状	胃部不快感

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能又は効果

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期等の場合の栄養補給

用法及び用量

下記の量を1日1回服用して下さい。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	30 mL

（用法用量に関連する注意）

用法・用量を厳守して下さい。

計量容器を添付します

成分及び分量

1日量（30 mL）中に次の成分を含んでいます。

成分	分量	成分	分量
{ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ}浸出液	3 mL	グルコン酸カルシウム水和物	50 mg
		チアミン塩化物塩酸塩(V. B ₁)	10 mg
淫羊藿浸出液	1 mL	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(V. B ₂)	3.2 mg
チクセツニンジン浸出液	1 mL	ピリドキシン塩酸塩(V. B ₆)	5 mg
L-リジン塩酸塩	300 mg	ニコチン酸アミド(ナイアシン)	20 mg
L-トレオニン	15 mg	オロチン酸	60 mg
グルクロノラクトン	100 mg	パントテン酸ナトリウム	30 mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	50 mg	イノシトール	60 mg
アルコール	0.9 mL以下		

添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 服用の期間中、瓶の中の液を汚さないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい。
- (6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。

お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06-6352-2381

受付時間 : 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1