

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

肩こりに伴う肩の痛み、腰・肘の痛みに  
消炎・鎮痛薬

リラテックス®

## 製品の特徴

リラテックスは、消炎鎮痛成分ピロキシカムを配合した非ステロイド性の消炎鎮痛薬です。ピロキシカムが痛みを感じさせる物質(発痛物質)の産生をおさえ、関節痛、腰痛や肩こりに伴う肩の痛み、肘の痛みなどに効果を発揮します。ゲルタイプでべとつかず、さわやかな使用感です。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

## 1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人
- (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (4) 15才未満の小児

## 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口
- (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部

## 3. 長期連用しないでください。



## 相談すること

## 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

## 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、落屑(皮膚片の細かい脱落)、光線過敏症(日光が当たった部位に起こる発疹や水ぶくれ等の炎症)

## 3. 5～6日使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

関節痛、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、打撲、捻挫

## 用法・用量

1日3～4回適量を患部に塗擦してください。

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 本剤塗擦後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (5) 使用後は手を洗ってください。

## 成分とはたらき

成 分	分量 (1g中)	は た ら き
ピロキシカム	5mg	組織が損傷したときに産生される発痛物質(プロスタグランジン)の産生をおさえ、痛みを緩和します。

添加物として、 $\beta$ -メントール、トリエタノールアミン、エタノール、セラニオール、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、カルボキシビニルポリマーを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないようにしてください。
- (5) 衣服などに薬剤の色が付着することがありますので、塗擦後はよく乾かしてください。
- (6) 本剤が床や家具、革製品、化成品等に付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### ●ワンポイント情報

肩こりや首・肩の痛みは、習慣化した悪い姿勢や運動不足も原因の一つです。姿勢を良くし、肩を軽く動かしたり、日頃から適度な運動を心がけましょう。また、精神的な緊張も肩こりを引き起こします。自分にあったストレス解消法を心がけましょう。



### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

☎ 03-3293-3363

受付時間 9時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く）



販売元

**湧永製薬株式会社**

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

**東興薬品工業株式会社**

富山県中新川郡立山町辻20