

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

にきび薬

第3類医薬品

ロイドキープ S

思春期になると、皮脂の分泌が活発になります。いつもはお肌をしっとりさせてくれる皮脂も、この時はにきびの大きな原因になります。

毛穴がいろいろな理由でせまくなってこの皮脂がたまってくるとにきびができやすくなります。さらに、細菌やホコリがその中にたまって炎症をおこしたり化膿したりするのです。

ロイドキープ Sには、できてしまったにきびを治す成分と、新しくにきびができないようにする成分が配合されています。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人
- (6) 深い傷やひどいやけどの人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師にご相談ください。

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

● 成分・分量(100g中)

イオウ.....5.0g

グリチルレチン酸.....0.3g

添加物としてベントナイト、グリセリン、エタノール、イソプロピルメチルフェノール、パラベンを含有します。

● 用法・用量

1日 2～3回、適量を塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 使用前に少量をひじの内側に塗り、翌日発赤、かゆみなどが認められた場合には使用しないでください。

● 効能・効果 にきび

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) ご使用後は、チューブの口、キャップをきれいにぬぐって、しっかりキャップをしてください。

● ニキビを治すために、次のことは守ってください。

- 朝夕、ぬるま湯と刺激の少ない石けんで、ていねいに顔と手を洗いましょう。
- 少なくとも1週間に3回、髪を洗いましょう。
- ニキビにさわったりつぶしたりしないようにしましょう。頬杖をつくのもやめておきましょう。
- 1日8時間は睡眠をとりましょう。
- 食事はバランスよくとりましょう。野菜もしっかり食べてください。
- 甘いものやナッツ類、油っこいものはひかえましょう。
- 便秘や胃腸障害のある人は早く治しましょう。
- 油分の多い化粧品(ファンデーションやコールドクリームなど)はできるだけ使わないで化粧水、乳液、口紅、アイシャドーなどでポイントメイクにしましょう。
- 洗顔後には、ロイドキープSをつけましょう。

○ お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部

電話(0798)42-6940(代表)

受付時間 月～金曜日 9:30～17:00
(祝祭日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元

六陽製薬株式会社

兵庫県西宮市鳴尾浜 1-6-63