

この説明文書はご使用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるように、大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

虫さされ、かゆみ、じんましん

ハイラップゲル

ハイラップゲルは虫さされ・じんましんなどによるかゆみをしずめる透明ゲルタイプのかゆみ止めです。

クロタミトン・リドカイン・ジフェンヒドラミンの相互作用により、かゆみをおさえますので、ひっかくことによる悪化を防ぎ、患部の治りを早めます。

又、アルコールを50%配合していますのでクールな使用感が特徴です。

野外(ゴルフ、釣り、ハイキングなど)にお出かけのときの携帯薬として、又家庭常備薬としても適しています。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。
目の周囲、粘膜、傷口、ただれているところ



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

● 成分・分量 (100g中)

ジフェンヒドラミン	1.0g
リドカイン	2.0g
l-メントール	3.0g
dl-カンフル	3.0g
グリチルレチン酸	0.3g
クロタミトン	5.0g

添加物としてカルボキシビニルポリマー、エタノール、1,3-ブチレングリコールを含有します。

● 用法・用量

1日1～数回 適量を塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 本剤の塗布時に、くすりの薄い皮膚がはがれ落ちてくる場合がありますので、強くこすらないで塗布してください。

● 効能・効果

虫さされ、かゆみ、じんましん

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は揮発性ですので、キャップをあけて放置するとチューブの口が白くなることがあります。使用後は密栓して保管してください。
- (5) 火気に近づけないでください。

○ お問い合わせ先

六陽製薬株式会社 開発管理部

電話(0798)42-6940(代表)

受付時間 月～金曜日 9:30～17:00

(祝祭日を除く)

発売元

日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元

六陽製薬株式会社

兵庫県西宮市鳴尾浜 1-6-63