

腰痛・うちみ・肩こり・筋肉痛に 10枚入
(5枚×2袋入)

オウバク末
5g配合

消炎・鎮痛・生薬入パップ剤

月 中 仙 ゲルパップ

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の部位には使用しないでください
 - 目の周囲、粘膜等。
 - しっしん、かぶれ、傷口。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

成分・分量 膏体100g中(1枚17g)

オウバク末…………… 5.0g ℓ-メントール…………… 0.5g
 ジフェンヒドラミン…………… 0.05g dl-カンフル…………… 0.3g
 サリチル酸メチル…………… 0.5g

添加物：ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン、デヒドロ酢酸Na、酸化チタン、カオリン、リン酸水素Ca、CMC-Na、グリセリン、D-ソルビトール、ケイ酸アルミン酸Mg、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリオキシエチレンセチルエーテル

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

特 長

- 生薬成分(オウバク末)による消炎鎮痛効果と、水溶性高分子電解物質を配合した基剤による冷湿布効果を合わせもち、熱感、はれ、痛みにすぐれた効果を発揮します。
- 伸縮布を使用していますので、関節部位や筋肉の動きにぴったりフィットし、ひじ、ひざ、足首などのはがれやすい部位にも大変効果的です。
- 粘着力が強く、しかも肌にやさしく、ジフェンヒドラミンを配合したかぶれにくいパップ剤です。

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

1日1～2回患部に貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・定められた用法・用量をお守りください。
- ・小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ・本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ・薬剤面のフィルムをはがし、そのまま患部に貼り、紙テープで止めるか包帯をしてください。
- ・汗をかいているときは、よくふきとってからお貼りください。
- ・患部の広さに応じて、フィルムの上から適当な大きさにハサミで切ってご使用ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、未使用分は袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめ、保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (6) 衣類に付着すると黄色に着色することがあります。
- (7) 本品は、生薬(オウバク末)をたくさん含んでいますのでまれに色調が異なることがありますが効果に変わりありません。

【お問い合わせ先】

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
 電話:03-3370-7174(代表)
 受付時間:9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

※帯状疱疹 本剤の使用中に痛みをともなう赤みを帯びた米粒大の水疱があらわれた場合にはウイルスによる帯状疱疹であることが多く、副作用と間違えられることがあります。このような場合には使用を中止して、皮膚科専門医の診察を受けてください。

発売元

日邦薬品工業株式会社
 東京都渋谷区代々木3丁目4番16号
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

製造販売元

三友薬品株式会社
 東京都足立区鹿浜1丁目9番14号