

第2類医薬品

この説明文書は服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

のんで効く 皮ふ炎、皮ふのかゆみ、鼻炎のくすり

タウロミン[®]

<錠剤>

皮ふ疾患の1/3は湿疹・皮ふ炎といわれ、近年鼻炎とともにこれらアレルギー症状をあらわす人が増加する傾向にあります。これには、最近の衣・食・住等生活環境の変化に加え、季節・気候等外的因子、体内の変調、栄養状態、ホルモン分泌等内的因子などが深く関係しているといわれます。

タウロミンは、これらの原因による皮ふの炎症や鼻炎に有効な和漢生薬に、カルシウム、ビタミン、アミノ酸などの栄養成分を配合した、皮ふ疾患・鼻炎のための内服治療剤です。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと

(眠気等があらわれることがある。)

3. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。 緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

口のかわき、眠気

(裏面につづく)

(表面のつづき)

4.5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 湿疹、皮膚炎、じんま疹、皮膚のかゆみ、鼻炎

用法・用量

次の1回量を1日3回服用してください。症状により、通常の2～3倍を服用することもできます。

年齢	1回量	1日服用回数
大人	4錠	3回
8～15才	2錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

12錠(1日量)中に次の成分・分量を含有いたします。

成分	分量
サイコ末・ハマボウフウ末・センキュウ末・ブクリョウ末・オウヒ末・キキョウ末・ショウキョウ末	各90mg
ドクカツ末・ケイガイ末・カンゾウ末	各54mg
リン酸水素カルシウム水和物	1,080mg
乳酸カルシウム水和物	360mg
ヨクイニン末	360mg
タウリン	36mg
グルクロノラクトン	36mg
チアミン硝酸物(V.B1)	7.2mg
リボフラビン(V.B2)	7.2mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)	3.6mg
ニコチン酸アミド	14.4mg
パントテン酸カルシウム	14.4mg
イノシトール	18mg
エルゴカルシフェロール(V.D2)	9μg(360I.U.)
クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.6mg
ラクトサン末	240mg

添加物：ブドウ糖、セルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg

〈成分に関連する注意〉

- (1) 本剤は、和漢生薬を配合していますので、ときに錠剤表面に茶褐色の斑点を生じることがありますが、効果には変わりありません。
- (2) 本剤の服用により尿が黄色くなるがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)によるものですから、心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないでください。(変色したり品質が変わることがあります。)
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お求めのお店又は日邦薬品工業株式会社 お客様相談室
「電話:03-3370-7174(代表)」にお願いいたします。
受付時間……9:00～17:00(土、日、祝日を除く)



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16



製造販売元
福井製薬株式会社
大阪市城東区今福東3丁目1番26号