

## 漢方薬 オオクサ小青龍湯エキス錠

### 特 徴

- アレルギー性鼻炎や気管支ぜんそくは、花粉、排気ガス、ダニなど様々な原因によって起こります。
- 漢方薬「小青龍湯」(しょうせいりゅうとう)は、鼻炎、鼻水、気管支ぜんそくにすぐれた効果をあらわします。
- 眠くなりにくいので、工作中や外出先で安心して服用になれます。



### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間 質 性 肺 炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなりない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

体力中等度又はやや虚弱で、うすい水様のたんを伴うせきや鼻水が出るものの次の諸症：

気管支炎、気管支ぜんそく、鼻炎、アレルギー性鼻炎、むくみ、感冒、花粉症



鼻 炎



気管支ぜんそく

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

15錠(成人の1日服用量)中、次の成分及び分量からなる小青竜湯エキス(2/3量)2783mgを含んでいます。

成 分	分 量
マ オ ウ (麻 黄)	2.0 g
シャクヤク (芍 薬)	2.0 g
ショウキョウ (生 姜)	2.0 g
カンゾウ (甘 草)	2.0 g
ケイヒ (桂 皮)	2.0 g
サイシン (細 辛)	2.0 g
ゴミシ (五味子)	2.0 g
ハンゲ (半 夏)	4.0 g

添加物としてバレイショデンプン、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



## その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

## 包 装

75錠 260錠

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元  **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **大草薬品株式会社**  
神奈川県横須賀市森崎1-17-15