

小児用 じゃっころ内服液

発熱性消耗性疾患時の栄養補給
虚弱体質に

指定医薬部外品

30mL



成分・分量 1瓶(30mL)中
チアミン硝化物……………3mg
リボフラビン酸エステルナトリウム…2mg
ピリドキシン塩酸塩……………3mg
ニコチン酸アミド……………15mg
タウリン……………500mg
ニンジンエキス……………60mg
〔原生薬として180mg〕
タイソウ流エキス……………0.2mL
〔原生薬として200mg〕
ケイヒチンキ……………0.07mL
〔原生薬として21mg〕

添加物として、クエン酸、D-ソルビトール、パラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、エタノール、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、香料、DL-リンゴ酸、ハチミツ、白糖を含有しています

*生薬成分のため濁りを生じることがありますので、よく振ってから服用してください。薬効には影響ありません

・本剤に配合されているリボフラビン酸エステルナトリウムにより尿が黄色になることがあります

保管及び取扱い上の注意

- 1.服用に際しては、記載事項をよくお読みください
- 2.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
- 3.小児の手の届かない所に保管してください
- 4.使用期限をすぎた製品は服用しないでください

発売元  日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
電話 (03) 3370-7174 (代表)
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>

小児用 じゃっこう内服液

発熱性消耗性疾患時の栄養補給
虚弱体質に

指定医薬部外品

30mL

小児用
じゃっこう内服液

使用上の注意

相談すること
次の場合は直ちに服用を中止し、容器を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
皮ふ：発疹・発赤、かゆみ
- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

用法・用量

5才以上14才未満は1日1回
1瓶(30mL)を服用してください

用法・用量に関連する注意

1. 用法・用量を守ってください
(他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意すること)
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

効能・効果

幼小児の発育期・偏食児・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・病中病後などの場合の栄養補給、
虚弱体質、滋養強壮



製造販売元



日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3