

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第2類医薬品

# 五苓散 粒状（分包）

## （ごれいさん）

### 製品の特徴

本剤は、褐色の顆粒で、特異なおいがあり、わずかに苦味があります。



### 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の人は服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児。

#### 🗨️ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみなどを起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヶ月くらい（急性胃腸炎に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

のどが渇いて、尿量が少なく、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

注）「しぶり腹」とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことです。

## 用法・用量

大人は1回に1包（1.6g）ずつ、1日3回食間に服用してください。

小児用量は大人用量を1とするとき、

14歳以下7歳まで	2/3量	3歳以下2歳まで	1/3量
6歳以下4歳まで	1/2量	1歳以下	1/4量以下

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分・分量

本剤は大人1日の服用量3包（4.8g）中に次の成分を含んでいます。

日局タクシヤ	1.4 g	日局ビヤクジュツ	0.84 g
日局チヨレイ	0.84 g	日局ケイヒ	0.56 g
日局ブクリョウ	0.84 g	食添シヨ糖脂肪酸エステル	0.32 g

## 保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

## その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、顆粒の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



長倉の漢方薬

製造販売元

長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16