



# LAVAN H

## レーバンH坐剤EX

8つの有効成分

**痔**の痛み・出血  
はれ・かゆみに



〈外用痔疾用薬〉

第2類医薬品

〔坐剤の取り出し方・挿入法〕 ①1個をミシン目から切りはなして、図のように合わせ目を左右に引き離して坐剤を取り出してください。②坐剤の底を持ち、先から肛門内に入るまで、指で十分に押し込んでください。



●排便時の痛みが激しいときは、排便の前に挿入しておくこと、痛みをやわらげ便の通りをよくします。●坐剤が外に出ないように挿入直後の激しい運動はなるべく避けるようにしてください。●挿入後の排便時に油のようなものが出ることがありますが、これは油脂性基剤の溶けたものですから心配ありません。

この面が底になるようにして、30℃以下で保管してください。



外用痔疾用薬  
販売名：レーバンH坐剤EX

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)患部が化膿している人。2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等) 3. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります。) 4. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。排尿困難。(5)次の診断を受けた人。緑内障。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症状           |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| 泌尿器  | 排尿困難         |
| その他  | 刺激感、化膿       |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症状  |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。       |
| 再生不良性貧血            | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |
| 無顆粒球症              | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。   |

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。口のかわき、眠気  
4. 10日間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】 成人(15歳以上)1回1個を1日1~3回、肛門内に挿入してください。

【用法及び用量に関連する注意】 (1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用してください。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用してください。(3)肛門にのみ使用してください。

【成分・分量】 1個(1.5g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg、リドカイン 60mg、酸化亜鉛 80mg、イソプロピルメチルフェノール 2mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 4mg、アラントイン 20mg、グリチルレチン酸 6mg、トコフェロール酢酸エステル 60mg 添加物として、ハードファットを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない30℃以下の涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)保管する場合は、坐剤の先を下にむけてこの箱に入れ、マークに従って立てて保管してください。(4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



~30°

こちらを上にして、30℃以下で保管ください。



第2類医薬品

# レーバンH坐剤EX



発売元  
日邦薬品工業株式会社  
東京都渋谷区代々木3-46-16  
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>



製造販売元  
万協製薬株式会社  
三重県多気郡多気町五桂1169-142

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

万協製薬株式会社  
「お客様相談室」  
電話 0598-30-5376  
受付時間 10:00~17:00  
(ただし、土、日、祝祭日は除きます)