

# センナ大黃甘草便秘錠

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔。

## 【用法及び用量】 大人(15歳以上)は、下記用量を1日1回就寝前又は空腹時に服用する。

症状	1回量
2～3日便通がないとき	2～4錠
4日以上便通がないとき	5～6錠

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量又は減量してください。

### 〈用法及び用量に関する注意〉

- 服用に際して、次のことに注意してください。
- (1) 定められた用法及び用量を厳守してください。
  - (2) 小児には、服用させないでください。

## 【成分及び分量】 本品1日量6錠中

日本薬局方 センナ末 600mg  
日本薬局方 ダイオウ末 500mg  
日本薬局方 カンゾウ末 150mg

添加物として乳糖水和物、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限(外箱記載)の過ぎた製品は使用しないでください。

## 【内容量】 180錠、360錠

お客様相談窓口

### 山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地  
お問い合わせ ☎ 0568-73-3131  
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)  
ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造  
販売元



山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地