

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。また、必要なときに読めるよう、大切に保管してください。用法・用量についての注意、使用方法などについては裏面をよく読んでください。

すぐ乾き水に強い、強い皮膜でキズを守るハケ付き液体絆創膏

液体絆創膏
12mL

ぬりバン

第3類医薬品

ハケ付き

ぬりバンは、強い皮膜をつくって傷を守る、すぐ乾く液体絆創膏(流動絆創膏)です。患部を清潔にし、ハケに適量とり、傷に塗ると、一瞬しみますが、そのまま静かに乾燥させると治まります。その後、透明な皮膜ができて、ばい菌の侵入を防ぎ、水やお湯などの刺激から傷を守ります。毎日の水仕事などから手をいたわり、スポーツやレジャーのお供に、ご家族や職場の常備薬として、お役立てください。

特長

- ①塗りやすいハケ付きタイプ
- ②透明で目立たず、はがれにくい強い皮膜をつくる
- ③バイ菌などから傷口をしっかりガード
- ④小きりきず、ひび、あかぎれ、さかむけ、靴ずれなどのすり傷に、さっとお手当ができる

こんなときに…



使用上の注意



してはいけないこと 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣など)
 - (2)ただれ、化膿している患部
 - (3)大きなキズ、深いキズ、湿疹および出血している患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

効能・効果

小きりきず、すりきず、ひび、あかぎれ、さかむけ

用法・用量

患部を清潔にし、傷部のみに適量を塗り、そのまま静かに乾燥させてください。

用法・用量についての注意

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
3. 本剤は、外用にのみ使用し、絶対に内服しないでください。
4. 患部に血液や水分がついていると薬液がつきにくいので、よくふきとってください。

使用方法

1. 患部を清潔にし、水分をよく拭き取ってください。
2. キャップを開けてハケに適量とり、傷に塗ってください。
3. 傷に塗った時、一瞬しみますがそのまま静かに乾燥させると治まります。
4. ハケを水で洗わないでください。(薬液が水に触れるとゲル状に固まります)
5. 使用後はキャップをしっかり締めてください。(キャップを密栓しないと、薬液が固まる場合があります)
6. 皮膜は自然に剥がれますが、急いで剥がしたいときは、薬液を皮膜の上に塗り、溶かしながら乾ききる前にふき取ってください。マニキュアの除光液でも取れます。

成分・分量(100g中)

成分	分量	はたらき
ピロキシリン	12g	皮膜を作り、患部をおおう

添加物として、トコフェロール酢酸エステル、パルミチン酸イソプロピル、酢酸エチル、エタノールを含有する。

保管及び取扱上の注意

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに、必ず密栓して保管してください。
3. 誤用をさけ、品質を維持するため、他の容器に入れかえないでください。
4. 火気に近づけないでください。
5. 衣服・家具等につくと非常にとれにくいので、つかないように注意してください。
6. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後はなるべく早くお使いください。
7. 揮発しやすい成分が含まれるため、使用しているうちに固まり、使えなくなる場合があります。

[問い合わせ先] 大木製薬株式会社
☎03-3256-5051「お客さま相談室」まで。
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元



大木製薬株式会社
東京都千代田区神田鍛冶町3-3