

2013年3月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

コンタクト装着時の不快感、目の疲れ

第3類医薬品

# アイブルーCL 眼科用薬 15mL

アイブルーCLは涙液タイプの目薬でコンタクトレンズを装着しているときの不快感を取り除きます。ソフト・O<sub>2</sub>・ハード・使い捨て等のコンタクトレンズをつけたままでも点眼できます。目のかわき、目の疲れ、目のかすみにも効果をあらわします。

## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3)次の症状のある人。

はげしい目の痛み

(4)次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)目のかすみが改善されない場合。
- (2)2週間位使用しても症状がよくなる場合。

## (効能・効果)

目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

## (用法・用量)

1回2～3滴を1日3～6回点眼してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守って使用してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

容器の先がまぶたやまつ毛に触れますと、目やにや雑菌等のため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。また、混濁したものは使用しないでください。

(4)点眼用にのみ使用してください。

### (キャップの開閉方法)

キャップのあけ方



キャップを左に回して開けてください。

キャップのしめ方



キャップを右に回して閉めてください。

◎必ずキャップを上にして、容器をしっかり持ってあけてください。

### (正しい点眼方法)

容器の先が目やまつ毛にふれないように点眼してください。



### (成分・分量)

本剤は100mL中に次の成分を含有します。

塩化ナトリウム 550mg

塩化カリウム 150mg

添加物：ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、クロルヘキシジングルコン酸塩、ヒドロキシエチルセルロース

### (保管及び取扱い上の注意)

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。高温下に放置した製品は、容器が変形して薬液が漏れたり、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので使用しないでください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり品質が変わることがあります。)

(4)汚染をさけるため、他の人と共用しないでください。

(5)外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに(2ヶ月以内に)使用してください。

(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。

その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってから使用してください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。

カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話06-6202-8911

受付時間 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)