

ローヤルゼリー・ビタミンE配合 第2類医薬品

# ロンタミンゴールド

**【成分・分量】1日量(100mL)中**

ローヤルゼリー150mg、ビタミンE液150mg(トコフェロール酢酸エステル:7.5mg)、ハンピチンキ100 $\mu$ L(原生薬換算量:9mg)、マタタビ流エキス30 $\mu$ L(原生薬換算量:30mg)、ゴオウチンキ200 $\mu$ L(原生薬換算量:2mg)、イカリソウエキス20mg(原生薬換算量:200mg)、パントテン酸カルシウム20mg、イノシトール100mg、ピリドキシン塩酸塩5mg、ニコチン酸アミド20mg、タウリン1,000mg、リポフラビンリン酸エステルナトリウム2mg、カフェイン水和物50mg 添加物:クエン酸水和物、dl-リンゴ酸、グルタミン酸Na、コハク酸Na、白糖、ブドウ糖、エタノール、安息香酸Na、ブチルパラベン、香料、プロピレングリコール、グリセリン(アルコール1mL以下)

◎本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のリポフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB<sub>2</sub>)によるものでご心配ありません。

**【効能・効果】** 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

**【用法・用量】** 成人(15歳以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

**⚠【使用上の注意】** 相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。胃部不快感、発疹、下痢

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合。

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5) 本剤は生薬成分を含有しており、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

使用期限

2011.09

製造番号

B J N 2

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



箱、中仕切り