

水なしで飲める
チュアブル錠

Kracie

くりかえす
にきび
肌あれに

ハトムギ専科

ビタミンBC^{プラス}
ヨクイニン
タブレット

ビタミンB₂B₆主薬製剤

Vitamin
B₂

Vitamin
B₆

Vitamin
C

〈販売名〉
ヨクイノーゲンBC錠 第3類医薬品

YOKUININ is for the treatment
of rough skin.

ビタミンB2B6主薬製剤

✂切り取り線

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

この説明文は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。

販売名:ヨクイノーゲンBC錠

第3類医薬品

チャック

⚠使用上の注意



相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】 次の諸症状の緩和:肌あれ、にきび、口内炎、湿疹、皮膚炎、口角炎、口唇炎、舌炎、かぶれ、ただれ

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

次の場合のビタミンB2B6の補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

【用法・用量】 1日3回食後、口の中で溶かすか、またはかみくだいて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
15才未満7才以上	1錠	
7才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分】 成人1日の服用量6錠(1錠350mg)中

リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル).....20mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6).....100mg

アスコルビン酸(ビタミンC).....300mg

ヨクイニンエキス[ヨクイニン7gに相当].....540mg

添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料、エリスリトール、CMC-Ca、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

〈成分に関連する注意〉

(1)本剤に含まれるリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色くなることがあります。

(2)本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。また、錠剤の表面に赤色の小さな斑点がみられる場合がありますが、これはリボフラビン酪酸エステルによるものです。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとしめて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。(5)水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。(6)パウチ内の乾燥剤はすてないでください。

発売元 **クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ www.kracie.co.jp

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **クラシエ 製薬株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

副作用被害救済制度の問合せ先

☎0120-149-931 00888

H03