

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 高齢者。(3) 次の症状のある人。むくみ
(4) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

● 偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

お問い合わせ先
興和(株)お客様相談センター
TEL 03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

かぜなどで
熱が出て
食欲のない時
体がだるい時の
栄養補給、滋養強壮に

ノン
カフェイン

生薬・ビタミン配合ドリンク剤

カルニチン
塩化物

タウリン

カンゾウ
エキス

ファイティー

第2類医薬品

ビタミン含有保健薬

■ 効能・効果 発熱性消耗性疾患・肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

■ 用法・用量 成人(15歳以上)1回1本、1日3回服用してください。

【用法・用量に関連する注意】用法・用量を厳守してください。

■ 成分・分量(30mL中) カンゾウエキス 375mg(カンゾウとして1,500mg)、ピリドキシン塩酸塩(V.B₆) 5mg、タウリン 333.33mg、パンテノール 20mg、カルニチン塩化物 33.33mg
添加物：白糖、グリセリン、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、安息香酸ベンジル、l-メントール

【成分・分量に関連する注意】本剤は生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあります。服用の際には瓶をよく振ってください。

■ 保管及び取扱い上の注意 (1) 高温をさげ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造 興和株式会社
販売元 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14



製造
番号
使用
期限