

2012年9月(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください

また必要ときに読めるよう大切に保管してください

使用期限(パッケージ裏面およびビンラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないこと

販売名: ナリピタン 第②類医薬品

△使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が
起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
15才未満の小児
2. 本剤を服用している間は、
次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、
鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬
など(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬など)
3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしない
こと(眠気などがあらわれることがある)
4. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 薬などによりアレルギー
症状やぜんそくを起こしたことがある人 (4) 今までに他の抗ヒスタミン剤、乗物酔い薬、かぜ薬、鎮咳去痰
薬などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみなど)を起こしたことがある人 (5) 次の症状の
ある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 緑内障(例えば、目の痛み、目のかすみなど)、心臓病

2. 服用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性が
あるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
泌尿器	排尿困難
循環器	血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、 気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること: 口のかわき、眠気、便秘、下痢
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は
服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または
登録販売者に相談すること

耳なり、肩こりに ナリピタン®

第②類医薬品

製品特徴

1. 気になる耳なり、肩こりを改善する内服薬です
2. 有効成分ニコチン酸アミド、パパベリン塩酸塩が、血行を改善し、ビタミンB群が加齢とともに衰えた神経の調子を整え、耳なり、肩こりを改善します

効能・効果

耳鳴症、皮膚炎、蕁麻疹(じんましん)、にきび、吹出物、肩こり

用法・用量

1回2～3錠、1日3回毎食後に水またはお湯で服用してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
 - (2) 吸湿しやすいため、服用のつどキャップをしっかりとしめること
- 15才未満は服用しないこと

成分・分量

9錠中

ニコチン酸アミド 180mg、カフェイン水和物 180mg、パパベリン塩酸塩 45mg、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB₁) 90mg、リボフラビン(ビタミンB₂) 9mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 18mg、アロエ末 18mg、アミノ安息香酸エチル 270mg
添加物として、アラビアゴム末、カオリン、ケイ酸Mg、セラック、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、デキストリン、白糖、バレイショデンプン、ヒマシ油、黄色4号(タートラジン)を含有する

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと
- (5) ピンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること
- (6) 乾燥剤は服用しないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

 発売元
小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先(お客様相談室)
☎0120-5884-01
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元
原沢製薬工業株式会社
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-17
10121821 MADE IN JAPAN