

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。  
使用期限(パッケージ側面およびチューブ底に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

# アセモア<sup>®</sup><sub>a</sub>

## パウダージェル

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

販売名:アセモアa

### 特 徴

- ①局所麻酔成分と抗ヒスタミン成分がかゆみをすばやく鎮め、殺菌成分があせもの悪化の原因となる雑菌を殺菌します
- ②ジェル基剤にパウダーを配合しているため、べたつかずサラサラした使い心地で、白残りしません
- ③非ステロイド・無香料・無着色で、大人から子供まで幅広くお使いいただけます

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと:目の周囲、粘膜など



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(裏面につづく)

## 効能・効果

あせも、かゆみ、ただれ、かぶれ、じんましん、皮膚炎、湿疹、虫さされ、しもやけ

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3)外用にのみ使用すること

## 成分・分量 100g中

ジフェンヒドラミン	1g	かゆみの発生を抑える
リドカイン	2g	局所麻酔作用で、かゆみを緩和する
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用で、雑菌の発生を抑える

添加物として、1,3-ブチレングリコール、二酸化ケイ素、ジメチルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、リン酸、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、パラベンを含有する

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2)小児の手の届かないところに保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合せは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10  
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先(お客様相談室)  
**☎0120-5884-01**  
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 **小林製薬株式会社**  
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3