

押して
開ける

鎮痒消炎薬

販売名: ラナケインL
Anti-Itch Lotion

第2類医薬品

特徴

- 背中など手が届きにくい部位にも塗りやすい、かゆみ止め薬です
- 局所麻酔成分と抗ヒスタミン成分がすばやくかゆみを鎮めます
- カサカサした患部にも使い心地の良い、しっとりローションタイプです

▲ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと: 目の周囲、粘膜等

☒ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 湿潤やただれのひどい人
- (5) 乳幼児

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名前	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

ラナケイン[®] ロングポトル

第2類医薬品

効能・効果

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、患部に適量を塗布する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
 - (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
 - (3) 外用にのみ使用すること
- 同じ部位に他の外用剤との併用はさけること ●患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと

成分・分量 (100mL中)

ジブカイン塩酸塩 0.3g
(局所麻酔成分) かゆみを素早く鎮めます

ジフェンヒドラミン塩酸塩 2.0g
(抗ヒスタミン成分) かゆみの発生を抑えます

グリチルリチン酸二カリウム 0.1g
(抗炎症成分) 炎症を鎮めます

ベンゼトニウム塩化物 0.1g
(殺菌成分) 雑菌の発生を抑えます

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、D-ソルビトール、d-1-ピロリドンカルボン酸Na、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン、メタクリル酸ブチル共重合体、ヒドロキシエチルセルローズ、エド酸Na水和物、ベンザルコニウム塩化物を含む

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

背中などの かゆみに!

ラナケイン[®] ロングポトル

背中に
届く
ロングポトル

しっとり
ローションタイプ

カサカサ肌

汗ムレ

下着のしめつけ

湿疹、皮ふ炎
かゆみ、かぶれ

第2類医薬品

90mL

小林製薬

あったらいいな
をかたにする
小林製薬

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要に応じて読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にキャップをしっかりと立てて立てて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●はじめて使用するときは、少し液を出してから使用してください

その他の注意

- 正立状態で液が出ないので、倒立状態で液をラバーに出してから塗り広げてください
- 本製品を使用する際は、ポトルを強く押さないようにしてください。液が大量に出て、液だれすることがあります

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪府中央区道修町4-4-10

製品のお問合せ先 (お客様相談室)

☎0120-5884-01

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

