

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品



コンドロイチン(軟骨抽出物質)
肝水解物・ローヤルゼリー配合

新ハイゼリーエースII

NEW HIJELLY ACE II

滋養強壮保健剤

滋養強壮，肉体疲労・病中病後などの場合の栄養補給に

〔特 徴〕

私たちはいつも健康でありたいと願っています。健康はバランスの良い食事，適度な運動，十分な睡眠など規則正しい生活習慣と，私たちの身体にそなわっている恒常性維持機能（ホメオスターシス）によって保たれています。

しかし目まぐるしく移り変わる現代社会の中で私たちの身体は，生活環境の変化や多忙，ストレスなどによってリズムを崩し，気づかないうちに無理がかかっています。そして次第に“近ごろどうも……”とか“何となく疲れが抜けない”といった疲労感や活力・気力の減退があらわれてきます。

新ハイゼリーエースIIは，新陳代謝を活発にし，滋養強壮，虚弱体質，肉体疲労時などの栄養補給に効果のあるコンドロイチン，ローヤルゼリー，肝水解物，人参(紅参)，ゴオウ，天然型ビタミンE及びビタミンB₁誘導体を配合した滋養強壮保健剤です。



⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後，次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので，直ちに服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤，かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後，次の症状があらわれることがあるので，このような症状の持続又は増強が見られた場合には，服用を中止し，医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘，下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し，この文書を持って医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 服用後，生理が予定より早くきたり，経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は，医師，薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

滋養強壮，虚弱体質，肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人(15才以上)	1カプセル	1日2回朝夕服用してください。
15才未満	服用しないでください。	

(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) (カプセル剤の取り出し方)

右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成 分〕 1日量(2カプセル)中

成 分	分 量	はたらき
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	全身の無数にある細胞を結びつけている“結合組織”の主要構成成分で、栄養分や水分を細胞に供給したり、老廃物の排泄など栄養代謝に重要な働きをしている物質です。
ローヤルゼリー	200mg	“女王蜂のミルク”又は“王乳”ともいわれるローヤルゼリーは、蜜蜂の働き蜂が保姆蜂と呼ばれる短い期間に、その咽頭腺から極く微量に分泌する乳白色ミルク状の物質で、滋養強壮剤として用いられています。その成分中にはビタミン様物質、アミノ酸、ミネラルの他、生理作用に関連のあるいくつかの物質が確認されています。
肝水解物	50mg	哺乳動物の新鮮な肝臓を加水分解して得られたもので、必須アミノ酸、ポリペプチド、核酸系物質などを含有し、滋養強壮などに効果があります。
ニンジン乾燥エキス (コウジン[紅参]700mg に相当)	70mg	自律神経系や内分泌系機能を調節する働きがあり、血行を促進して新陳代謝を活発にし、滋養強壮、虚弱体質に効果があります。
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	100mg	内分泌系機能を調節し、ホルモンバランスを改善したり、体内脂肪の酸化を防ぐとともに末梢血管の血液循環を改善して、全身の新陳代謝を活発にします。
ゴオウ	4mg	牛の胆石を乾燥し粉末にしたもので、肝機能を活発にしたり、鎮静・強心作用を有することから、滋養強壮に効果があります。
ビスベンチアミン (ビタミンB1誘導体) (ビタミンB1塩酸塩として21.9mg)	25mg	腸管からの吸収が良く、新陳代謝を活発にし、肉体疲労時などのビタミンB1補給に有効です。

添加物：バレイショデンプン、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ゼラチン、酸化チタン、赤色二号、黄色五号、ラウリル硫酸ナトリウム

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080

〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11

受付時間 9:00～17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

ハイゼリーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11