

指定医薬部外品

www.regain.jp

販売名:リゲインS1

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024

使用に際しては説明書きをよく読むこと。

■1本(50mL)中の成分■ ベンフォチアミン(ビオタミン:ピタ
ミンB₁誘導体)10mg、ピタミンB₂リン酸エステル 5mg、ピタ
ミンB₆ 10mg、ニコチン酸アミド 30mg、無水カフェイン 50mg、
ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール)30mg、タウ

リン 1000mg、
トウキエキス
45mg (当帰
150mgに相
当)、オウセイ
エキス 90.9
mg(黄精300
mgに相当)

●添加物:白糖、ハチミツ、D-ソルビトール、ブドウ糖、
アセシルファムK、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、5'-イノシン
酸2Na、L-グルタミン酸Na、安息香酸Na、グルコン酸Ca、アルコール、
カラメル、香料、グリセリン、プロピレングリコール、バニリン、エチル
バニリン、ビタミンE、ミツロウ (アルコール0.39mL以下)

■効能・効果■ 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・
栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、
滋養強壮、虚弱体質

使用期限

製造番号 ①登録商標

リゲイン®

肉体疲労時の栄養補給に

Regain®

ピンは割れものですので、
お取扱いにご注意下さい。

販売元 第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造 田村薬品工業株式会社

販売元 奈良県御所市西寺田50

■用法・用量■ 成人(15歳以上)1日1回
1本(50mL)を服用する。(用法・用量に

関連する注意)用法・用量を守
ること(他のビタミン等を含むす
る製品を同時に使用する場合は
過剰摂
取等に
注意す
ること)。

使用上の注意

相談すること

次の場合は、直ちに

服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に
相談すること。1.服用後、皮ふに発疹、消化器に胃部
不快感、下痢の症状があらわれた場合

2.しばらく服用しても症状がよくなりません

■保管及び取扱い上の注意■ 1.直射日光の当たらない
涼しい所に保管すること。2.小児の手の届かない
所に保管すること。3.生薬エキスを配合しています
ので、ときに沈殿を生じることがありますが、効果に
は変わりありません。よく振って服用して下さい。



Daiichi-Sankyo