

第2類医薬品

胃のもたれ、食べすぎ、胸やけに

新フジサワ胃腸薬クール

生薬配合

新フジサワ胃腸薬クールの特徴

1. 芳香性健胃生薬シュクシャ末、チョウジ末、ケイヒ末の配合により、胃のはたらきを良くします。
2. 脂肪の消化を助けるリパーゼとデンプンの消化を助けるビオジアスターゼのはたらきにより、食物の消化を高めます。
3. カンゾウ末と制酸剤のはたらきにより、胃を保護します。

〔新フジサワ胃腸薬クールはこんな時に〕



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

もたれ(胃もたれ)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸やけ、胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胃酸過多、胸つかえ、胃部不快感、胃重、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胃痛、胃部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|------------|------------|-------------|
| 15歳以上 | 1包 | 3回 (毎食後) |
| 11歳以上15歳未満 | 2/3包 | |
| 8歳以上11歳未満 | 1/2包 | |
| 5歳以上8歳未満 | 1/3包 | |
| 3歳以上5歳未満 | 1/4包 | |
| 3歳未満 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)3歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

本剤は、緑色で特異な芳香と清涼味がある顆粒で、3包(1包1.5g)中に次の成分を含有しています。

シュクシャ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60mg
チョウジ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105mg
ケイヒ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240mg
カンゾウ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300mg
ビオジアスターゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300mg
リパーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60mg
炭酸水素ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1650mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム・・・・・・・・・・・・・・・・1200mg
添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、銅クロロ
フィリンNa、無水ケイ酸、L-メントール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合は、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

AK