

発熱性消耗性疾患

第3類医薬品

病中病後の栄養補給に

ハイアップ®

内服液



酸味をおさえました

HI-UP ORAL LIQUID

Ophiopogon japonicus
Zizyphus jujuba
Glycyrrhiza uralensis
Cinnamomum cassia
Lycium chinense



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

使用前にこの箱の説明文書を
必ずお読み下さい。

ハイアップ内服液

第3類医薬品

△使用上の注意 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〈効能・効果〉 ●発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・肉体疲労・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 ●滋養強壮 ●虚弱体質

〈用法・用量〉 成人1回1瓶(30mL)を1日2回服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は生薬成分により濁りがあります。まれに沈殿することがありますのでよく振って服用して下さい。

〈保管及び取扱い上の注意〉

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

〈成分・分量〉 1瓶(30mL)中
バクモンドウ流エキス……………0.7mL
(原生薬として……………700mg)
タイソウ流エキス……………0.5mL
(原生薬として……………500mg)
カンゾウ流エキス……………0.3mL
(原生薬として……………300mg)
ケイヒチンキ……………0.15mL
(原生薬として……………45mg)
クコシ流エキス……………0.12mL
(原生薬として……………120mg)
タウリン……………500mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
……………5mg
ピリドキシン塩酸塩……………5mg
ニコチン酸アミド……………20mg
(アルコール……………0.5mL以下)
添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、香料、バニリン、エチルバニリン、グリセリン、プロピレングリコール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されているリボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア(株)
お客様相談室

電 話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

®登録商標

M

販 売 元 **第一三共ヘルスケア株式会社**

東京都中央区日本橋3-14-10

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

製造販売元 **日東薬品工業株式会社**

京都府向日市上植野町南開35-3