

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

花粉、ハウスダスト等による鼻のアレルギー症状に

NEW エージーノーズ[®] モイスト

クロモグリク酸ナトリウム配合点鼻薬

NEW エージーノーズモイストの特徴

1. 抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」を配合した「アレルギー専用」点鼻薬です。
2. 「クロモグリク酸ナトリウム (抗アレルギー剤)」が肥満細胞膜を安定化し、鼻水・鼻づまり等のアレルギー症状を引き起こす誘発物質 (ヒスタミン等) の放出を抑制します。
3. 「クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)」がヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。
4. 「ナファゾリン塩酸塩 (血管収縮剤)」が鼻づまり等を緩和します。
5. 花粉、ハウスダスト等による鼻水、鼻づまり、くしゃみといったアレルギーによる不快症状に効果を発揮します。
6. 高粘性の薬液が液ダレしにくく患部に留まります。
7. どの角度からも噴霧可能なエアレス容器 (移動弁式噴霧タイプ) を使用しています。



NEW エージーノーズモイストのはたらき



クロモグリク酸ナトリウム (抗アレルギー剤)

肥満細胞膜を安定化し、アレルギー症状を引き起こす誘発物質 (ヒスタミン等) の放出を抑制します。



クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)

ヒスタミンの受容体結合をブロックし、すでに起きてしまった症状を緩和します。

ナファゾリン塩酸塩 (血管収縮剤)

鼻粘膜のはれや充血をおさえ、鼻づまり等を緩和します。

イメージ図



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
 - (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	刺激感、鼻出血、はれ
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 3日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)


使用法

年齢	1回量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1度ずつ、両鼻腔内に噴霧して下さい。	3~5回 (3時間以上の使用間隔をおいて下さい)
7歳以上15歳未満		
7歳未満	使用しないで下さい。	

3日間使用しても症状の改善がみられない場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 使用法を厳守して下さい。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (4) 点鼻用にのみ使用して下さい。

<p>1. 使用前にていねいに鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまさないで下さい) 青いキャップをはずして、図のように容器を持って下さい。 (使い始めは、薬液が噴霧するまで数回、空押しして下さい)</p>  <p>青いキャップをはずす</p>	<p>2. ノズルの先を軽く鼻腔に入れ、薬液を1回噴霧して下さい。もう一方の鼻腔でも同じ操作をくり返して下さい。</p> 	<p>3. 使用後は鼻に接する部分を清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めて下さい。</p> 
--	---	--

どの角度からも噴霧可能なエアレス容器(移動弁式噴霧タイプ)を使用しています。

成分・分量

本剤は半透明な液で、100mL中に次の成分を含有しています。

クロモグリク酸ナトリウム……………1g
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.25g
ナファゾリン塩酸塩……………0.025g
添加物：カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、等張化剤、pH調節剤

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 03(5205)8331
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

®登録商標

販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
東興薬品工業株式会社
富山県中新川郡立山町辻20