

服用に際しては、この添付文書（説明文書）を必ずお読みください。
また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。



大幸薬品

止瀉薬
ピシヤット®

第2類医薬品

- 【特長】○通勤・通学途中、会議中、移動中などの外出先で突然おこる下痢に効果を発揮するお薬です。
- 携帯に便利なスティックタイプ、どこでものめる顆粒剤です。
- お口の中でさっと溶け、後味すっきり、フルーツ風味の顆粒剤です。
- 3才から服用できる顆粒剤です。

【使用上の注意】△

してはいけないこと ☒

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります）

相談すること

1. 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている方
 - (2) 発熱を伴う下痢のある方、血便のある方又は粘液便の続く方
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある方
（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります）
 - (4) 妊婦又は妊娠していると思われる方
 - (5) 高齢者
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある方
 - (7) 次の症状のある方
排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた方
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書（説明文書）を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書（説明文書）を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

（裏面もお読みください）

【効能・効果】

腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年 令	1 回 量	1 日服用回数	服用間隔
成人（15才以上）	1包	3回を限度とする	4時間以上
11才以上15才未満	2/3包		
8才以上11才未満	1/2包		
5才以上8才未満	1/3包		
3才以上5才未満	1/4包		
3才未満	服用しないでください		

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を必ず守ってください。
- (2)3才以上の小児に服用させる場合には、服用量の間違いを起さないように保護者の監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

3包（成人の1日最大服用量）中、次の成分を含みます。

成 分	分 量	は た ら き
タンニン酸ベルベリン	300mg	腸内の有害菌を殺菌して異常な腐敗を抑え、腸の粘膜を保護して炎症を抑えます。
ロートエキス散 20%	300mg (ロートエキスとして 60mg)	胃腸の働きをコントロールする神経に作用して、腸の過剰な運動を抑え、痛みを抑えることで、腹痛を伴う下痢に効果を発揮します。

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、タルク、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン及び香料を含有します。

【成分に関連する注意】

- (1)本剤は生薬を用いた製品のため、顆粒の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。
- (2)本剤に配合の「タンニン酸ベルベリン」が黄色の成分のため、黄色の顆粒となっています。着色料は配合していません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 小児の手の届かない所に保管してください。
2. 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器には絶対に入れかえないでください。
3. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
4. 使用期限を過ぎたものは、服用しないでください。
5. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してなるべく湿気を防いで保管し、2日以内に服用してください。

本剤の服用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

大幸薬品株式会社 お客様相談係：電話(06)6382-1095

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
電話：0120-149-931

発 売 元
製造販売元



大幸薬品株式会社 大阪府吹田市内本町3-34-14
株式会社パナケイア製薬 富山県高岡市中田4576