

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# 奇 応（エキス顆粒）

（漢方製剤）

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - （1）医師の治療を受けている人。
  - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - （3）胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - （4）高齢者。
  - （5）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - （6）次の症状のある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、ときに手足のほてりなどがあるものの次の諸症：  
動悸、息切れ、脈のみだれ

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包(2.2g)	3回
7歳以上15歳未満	成人の2/3量	
7歳未満	服用しないこと	

食間とは…  
食後2~3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本品3包(1包2.2g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)1.6gを含有します。

シャカンソウ	----- 1.5g	ショウキョウ	----- 0.5g
ケイヒ	----- 1.5g	マシニン	----- 1.5g
タイソウ	----- 1.5g	ニンジン	----- 1.0g
ジオウ	----- 2.0g	バクモンドウ	----- 3.0g
アキョウ	----- 1.0g		

添加物として乳糖水和物を含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電話      03-3843-3833  
受付時間      9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7