

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

# 四 逆 散（エキス顆粒）

（漢方製剤）



## 使用上の注意



### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）医師の治療を受けている人。

（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。

（3）体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

#### 2. 1ヵ月位（胃炎、胃痛、腹痛に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度以上で、胸腹部に重苦しさがあり、ときに不安、不眠などがあるもの次の諸症：胃炎、胃痛、腹痛、神経症

## 用法・用量

食間に水又はお湯にて服用

年齢	1回量	1日服用回数
成人	1包(2g)	3回
7歳以上 15歳未満	成人の2/3量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/2量	
2歳以上 4歳未満	成人の1/3量	
2歳未満	成人の1/4量以下	

食間とは…  
食後2～3時間を  
指します。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

## 成分・分量

本品3包(1包2.0g)中、下記生薬より製した水製エキス(乾燥エキスとして)0.8gを含有します。

サイコ ----- 1.0g      キジツ ----- 1.0g

シャクヤク ----- 1.0g      カンゾウ ----- 0.5g

添加物として乳糖水和物及びバレイシヨテンブンを含有します。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りをを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載されています。

## お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂      お客様相談室  
電話      03-3843-3833  
受付時間      9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう  
株式会社 **建林松鶴堂**  
〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7