

## 第3類医薬品

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

# 新スピード膏S（外用鎮痛消炎薬） 温熱プaster

無臭性の温感プasterである新スピード膏Sは、トウガラシの辛味成分と同じ温感刺激作用により血行を促進するノニル酸ワニルルアミドと、鎮痛・消炎作用がある無臭性のサリチル酸グリコールを配合した貼り薬（プaster）で、肩こり、腰痛、筋肉痛などに効果をあらわします。

### 特長

- 温感タイプのプaster
- 無臭性でにおいが気にならない
- 目立たない肌色・小型タイプ



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

- (1)目の周囲、粘膜など。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

### 効能・効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、打撲、捻挫、関節痛、筋肉疲労、しもやけ

### 用法・用量

1. 膏面を覆っているライナーをはがし、患部に直接貼り、四隅はよくおさえてください。
2. 1日数回、お貼りください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (4)皮ふの弱い人は同じ部位へ続けて使用しないでください。
- (5)患部が汗などでぬれている時は、よくふきとってから使用してください。
- (6)貼ったまま入浴されますと痛みを感じる場合がありますので、入浴の30分～1時間位前にはがしてください。また入浴後はしばらく時間をおいてから使用してください。

### 成分・分量 本品1.0m<sup>2</sup>中

成分	分量	はたらき
ノニル酸ワニルルアミド	0.15g	温感刺激作用により、患部の血行を促進します。
サリチル酸グリコール	3.00g	経皮吸収のよい無臭性の鎮痛・消炎剤です。

添加物：ハイシスポリイソプレンゴム、ポリスチレン・ポリイソプレン・ポリスチレンゴム、脂肪族系炭化水素樹脂、炭酸Ca、酸化亜鉛、BHT、酸化鉄、三二酸化鉄



**保管および取扱い上の注意**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は、袋の口を折りまげ、箱に入れて保管してください。
- (5)期限を過ぎた製品は使用しないでください。

**お問い合わせは**

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

**製造販売元**

**常盤薬品工業株式会社**

**大阪市中央区安土町3-5-12**

**NOEVIR GROUP**