


# のど飴で殺菌バリア

指定医薬部外品

**口腔内の  
殺菌・消毒、  
のどの不快感に**



**殺菌成分CPC  
6mg配合(1日量6錠中)**

**レモン  
風味  
シュガーレス**

## トキワ薬用のど飴(口腔咽喉薬)

使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。  
必要なきに読めるように、大切に保管してください。

**使用上の注意[相談すること]** 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。(2)本人または家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)5~6日間使用しても症状がよくなる場合。

**効能・効果** 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ  
**用法・用量** 成人(15才以上)1回1錠を1日6回、5才以上15才未満1回1錠を1日3回、いずれも1錠ずつ口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を使用後は、2時間以上の間隔をおいて使用してください。<用法・用量に関連する注意>(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。**成分・分量** 1日量(6錠)中 セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)6mg 添加物:還元パラチノース、グリセリン脂肪酸エステル、リボフラビン、クエン酸、l-メントール、香料(エタノール、ダイズ油、ビタミンE) **保管および取扱い上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)分割して残った薬は、袋の口を折り曲げて保管し、すみやかに使用するが、廃棄してください。

**製造販売元**  
常盤薬品工業株式会社  
大阪市中央区安土町3-5-12

1錠あたり3kcal

**NOEVIR GROUP**  
お問い合わせは  
常盤薬品工業株式会社  
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)  
www.tokiwayakuhin.co.jp

指定医薬部外品

067930  
TISF101