

## 第3類医薬品

肌あれ、にきび、口内炎、疲れに

販売名 **マスチゲン®BBゼリー**

ご使用に際して、以下の注意書きをよくお読み下さい

**グレープフルーツ味**

水なしで、かんで服用

コラーゲンづくり等を助ける4つのビタミン配合により、肌あれ・にきび・口内炎を内側から治します。ゼリーの錠剤ですから、水なしで、かんで服用できます。職場や学校でも手軽に服用していただける<sup>にがみ</sup>苦味のないグレープフルーツ味。低カロリー。

## 特長

1. 水あめやカンテンを原料とした、ゼリーでつくった錠剤ですから、水なしで、かんで服用できます。
2. 普通の錠剤を飲み込むのが苦手な方でも服用が簡単です。
3. お肌の真皮層を形成するコラーゲンづくりを助けるビタミンC、お肌や粘膜を正常な状態に保つビタミンB<sub>2</sub>・ビタミンB<sub>6</sub>配合により、肌あれ・にきび・口内炎を内側から治します。
4. 疲れの栄養補給にも効果的です。
5. 携帯しやすいアルミ袋包装。

### 使用上の注意

**相談すること** 1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**【効能】** 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。」

次の場合のビタミンB<sub>2</sub>の補給：肉体疲労時、病中病後の体力低下時、妊娠・授乳期

**【用法・用量】** 7歳以上15歳未満1回1錠を1日2回（1日分7.5キロカロリー）、15歳以上1回2錠を1日2回（1日分15キロカロリー）、朝夕にかんで服用して下さい。

### <用法・用量に関連する注意>

1. かんで服用して下さい。2. 定められた用法・用量をお守り下さい。3. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

**【成分・分量】** 成人1日量4錠中  
ビタミンC180mg、ビタミンB<sub>2</sub>酪酸エステル20mg、ビタミンB<sub>6</sub>12mg、ニコチン酸アミド（ビタミンの一種）40mg 添加物として水アメ、カンテン、白糖、ペクチン、エリスリトール、トコフェロール酢酸エステル、ポリソルベート80、香料、その他2成分を含みます。本剤の服用により、尿が黄色くなる場合がありますが、配合されているビタミンB<sub>2</sub>の一部が尿中に排泄されるため心配はありません。

**【保管及び取扱い上の注意】** 1. 錠剤を袋から取り出したらずちに服用して下さい。2. 直射日光の当たらない涼しい所にチャックを閉じて保管して下さい。3. 他の容器に入れ替えないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）。4. 容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。5. 使用期限を過ぎた商品、使用前に開封された形跡のある商品は服用しないで下さい。6. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

販売

**日本臓器製薬株式会社**

大阪市中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06-6222-0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

**大木製薬株式会社**

東京都千代田区神田鍛冶町3-3

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

