

目のかすみ・疲れ目に

# 眼涼<sup>®</sup>α【がんりょうアルファ】

生薬由来成分、ビタミンE・B<sub>6</sub>、アミノ酸配合

## 商品の特長

- テレビ、パソコン、携帯電話など私たちは目の疲れやすい環境で生活しています。
- 眼涼αは生薬の甘草(グリチルリチン含有)に由来する成分に、目の細胞に栄養を与えるビタミン、アミノ酸をプラスアルファした目薬です。またピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、角膜保護、眼病予防に効果のあるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合しました。これらをはじめとした7つの有効成分が「目のかすみ」「疲れ目」「かゆみ」などの症状に効果的に作用します。

## ⚠️【使用上の注意】



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人：はげしい目の痛み。
  - 次の診断を受けた人：緑内障。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - 目のかすみが改善されない場合。
  - 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

**【効能・効果】** 目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

**【用法・用量】** 1日3~6回、1回2~3滴点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染又は混濁することがあるので、触れないよう目から少し離して使用してください。また、混濁したものは使用しないでください。
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 本剤は点眼剤です。点眼の目的以外には使用しないでください。

【成分・分量】	有効成分	含有量(10mL中)	はたらき
	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.5mg	毛様体筋のピント調節機能低下を改善し、目の疲れをやわらげます。
	グリチルリチン酸二カリウム (生薬由来成分)	25mg	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を改善します。
	ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB6)	5mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
	トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	2.5mg	血行改善作用により、目への栄養補給が促され、疲れた目の回復を助けます。
	L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム [等量混合物]	100mg	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸活性化とともに栄養を与え目の疲れを癒します。
	タウリン	50mg	目に栄養を与えるとともに代謝改善作用がいたんだ目の組織修復を助けます。
	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	25mg	角膜を保護し、目にうるおいをあたえ栄養補給を促進します。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、L-メントール、グリセリン、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、ホウ砂、ホウ酸、ポリソルベート80を含有します。

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は、できるだけ速やかに使用してください。

《包装》10mL

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

発売元  **久光製薬株式会社** 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

久光製薬お客様相談室：☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **佐賀製薬株式会社** 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉481