

生薬エキス錠

マヤ養命錠

第②類医薬品

☆マヤ養命錠は、12種の生薬から得られたエキスを主体に、ジプロフィリン、ルチン水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、イノシットなどを配合した循環器用薬です。浮腫、息切れ、不眠等の症状を改善します。
☆糖衣錠ですので、服用しやすくなっています。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
強心薬、ぜんそく薬、眠気防止薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。



相談すること

- * 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人、胃腸が弱く下痢しやすい人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
食欲不振、吐き気・嘔吐、軟便、下痢、排尿困難



- (9) 次の診断を受けた人
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病、てんかん
- (10) 次の医薬品を服用している人
瀉下薬(下剤)

- * 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、吐き気・嘔吐、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛
精神神経系	不眠、発汗過多、頻脈、動悸、全身脱力感、精神興奮
泌尿器	排尿障害

- * 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便、下痢

- * 4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

高血圧症、動脈硬化症、うつ血性心不全

上記疾患に随伴する浮腫、ドウキ、息切れ、不眠等

用法・用量

次の量を、食間に、水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	3~5錠	2~3回
15歳未満	服用しないこと	

服用時間を守りましょう。

食間：食後2~3時間後の空腹時を指します。

<用法・用量に関する注意>

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

15錠(成人1日最大服用量)中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	成 分	分 量
ジプロフィリン	450.0mg	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	200.0mg
ルチン水和物	150.0mg	イノシット	200.0mg
ニコチン酸	75.0mg	摩耶養命湯エキス*	3000.0mg

※下記生薬より製したエキス

成 分	分 量	成 分	分 量	成 分	分 量
キョウニン	0.9g	ダイオウ	0.6g	センキュウ	0.9g
ニンジン	0.3g	ショウキョウ	0.6g	ボウフウ	1.2g
ケイヒ	0.9g	トウキ	1.2g	カンゾウ	0.6g
シャクヤク	0.9g	マオウ	0.9g	キヨウカツ	1.2g

添加物としてCMC-Ca、セルロース、水酸化Al、クロスCMC-Na、メタケイ酸アルミニン酸Mg、ステアリン酸Mg、銅クロロフィリンNa、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、タルク、セラック、マクロゴール、ヒプロメロース、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に

密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

(4)瓶のフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また、本剤をぬれた手で扱わないでください。

(5)瓶の中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。
開封後は不要となりますので取り除いてください。

(6)箱と瓶の「開封年月日」記入欄に、瓶を開封した日付を記入してください。

(7)一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。

(8)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



お問い合わせ先

本製品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡お願い申し上げます。

摩耶堂製薬株式会社 「くすりの相談室」

〒651-2142 神戸市西区ニツ屋1-2-15 電話 (078)929-0112

受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日、弊社休日を除く)

製造販売元



摩耶堂製薬株式会社

神戸市西区玉津町居住65-1