

頻尿・残尿感改善薬

MEDICARE®

メディケア®シリーズ

気になる頻尿・残尿感に

【販売名】 **アクティル**

- アクティルは、有効成分フラボキサート塩酸塩を配合した女性の頻尿や残尿感を改善するお薬です。
- アクティルは、膀胱を収縮させる筋肉に直接働きかけ、その緊張をゆるめて膀胱に溜められる尿の量を増やすことで、排尿回数を減らし、残尿感を改善します。
- 服用しやすいコーティング錠で、携帯に便利なPTP包装です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 男性（男性は前立腺肥大症による症状の可能性があり、本剤を服用すると尿が出にくくなる恐れがあります。）
- (2) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 15歳未満の小児
- (4) 妊婦又は妊娠していると思われる人（妊娠中の服用については、安全性が十分に確認されていません。）
- (5) 医療機関にて幽門、十二指腸及び腸管の閉塞の診断を受けた人
- (6) 次の症状等がある人（何らかの重篤な疾患等による症状の可能性があるので、泌尿器科の専門医を受診してください。）
 - ・脳脊髄疾患（脳腫瘍、脳梗塞や脳出血等の脳血管障害、パーキンソン病、脊髄損傷、脊椎腫瘍等）の診断を受けた人
 - ・子宮癌又は直腸癌等の骨盤内手術を受けた人
 - ・血尿、排尿痛、膀胱痛、尿失禁の症状のある人
 - ・日中の頻尿がなく、就寝後のみ頻尿のある人
 - ・発症が急性（発症後1ヵ月以内）の人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 服用前後は飲酒しないでください。

5. 長期連用しないでください。

(1ヵ月以上服用する場合、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して服用してください。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 授乳中の人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の診断を受けた人
 - 心臓病、緑内障、肝臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、食欲不振、吐き気・嘔吐、胃痛、腹痛、胸やけ
精神神経系	頭痛、めまい、頭部のふらふら感、しびれ感、不眠
泌尿器	排尿困難、尿閉
その他	下腹部膨満感、ほてり、異常なまぶしさ、つかれ目、動悸、胸部不快感、咽頭部違和感、かれ声

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢、眠気

4. 1週間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（他に何らかの疾患があることによる症状の可能性があるので、泌尿器科の専門医を受診してください。）

効能・効果

女性における頻尿（排尿の回数が多い）、残尿感

用法・用量

次の量を、水又はお湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人女性(15歳以上)	1錠	3回
成人男性(15歳以上)	服用しないこと	
15歳未満		

<用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方：右図のように錠剤の入っているPTPシート

の凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り

出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる

等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

(3錠中)

成 分	分量	働 き
フラボキサート塩酸塩	600mg	膀胱機能を調整して、頻尿や残尿感を改善します。

添加物としてトウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール6000、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4) PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。

(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または

次のところにお問い合わせください。

森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003

受付時間 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元

森下仁丹株式会社

大阪府中央区玉造1丁目2番40号

<http://www.jintan.co.jp>

製造販売元

KOA コーア商事株式会社
横浜市港北区箕輪町2丁目17番5号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>