

この添付文書は、服用前に必ずお読みください。
なお、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

第2類医薬品

滋養強壯保健薬

MEDICARE®

メディケア®シリーズ

プラセンプリマ®内服液

絨毛組織加水分解物とは…

絨毛組織加水分解物とは、プラセンタ（胎盤）を素材とし、その皮膜等を取り除いた有用成分を含む絨毛組織を加水分解して得られたもので、人間の生体に必要なタンパク質、アミノ酸、ビタミン、ミネラル等を豊富に含んでいます。その歴史は古く、紀元前から使われています。

プラセンプリマ®内服液は

プラセンプリマ®内服液は、疲れが取れない、朝から身体が重くてだるいなどの現代社会に多い疲労や体力低下を改善する滋養強壯保健薬です。

筋肉や臓器、血液のもとになるアミノ酸やビタミンを豊富に含んだ絨毛組織加水分解物、肉体疲労時や病中病後に不足しがちなビタミンB群が栄養分を補い、優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部膨満感、食欲不振、下痢、吐き気・嘔吐

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

裏面もお読みください

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1本（30mL）	1回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)本剤中のビタミンB₂（リボフラビンリン酸エステルナトリウム）により、尿が黄色になる場合があります。

成分・分量

30mL（成人の1日服用量）中

成分	含量	はたらき
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	5mg	脂肪の代謝を助けエネルギーに変えます。
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	5mg	タンパク質の代謝を助けエネルギーに変えます。
ニコチン酸アミド	20mg	生体内でエネルギー産生や、脂質の代謝、アミノ酸代謝などに関与します。
絨毛組織加水分解物	544mg	プラセンタ（胎盤）抽出物で筋肉や臓器、血液のもとになり、疲労回復作用があります。
無水カフェイン	50mg	興奮作用を示し、疲労を残しにくくします。

添加物として、白糖、D-ソルビトール液、無水クエン酸、dl-リンゴ酸、安息香酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム水和物、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、または次のところにお問い合わせください。
森下仁丹株式会社「お客様相談室」06-6761-0003
受付時間 平日9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構 ☎0120-149-931
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元 **森下仁丹株式会社**
大阪市中央区玉造1丁目2番40号
<http://www.jintan.co.jp>

製造販売元  **原沢製薬工業株式会社**
東京都港区高輪3丁目19番17号