

第3類医薬品

肩こり・腰痛・筋肉痛に

鎮痛・消炎 微香性プラスター

新パスタイン[®]





薄い

目立たない

匂わない

フィルムタイプの貼りぐすり

ビタミンE配合



発売元  オールジャパンドラッグ株式会社
東京都中央区日本橋本町2-6-3

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

新パスタイン[®]U

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎ 0120-149-931

新パスタインUはすぐれた鎮痛消炎作用のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

⚠️【使用上の注意】

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸グリコール4.3g
 l-メントール6.1g
 トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)4.3g
 ノニル酸ワニリルアミド0.012g
 添加物として BHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
- 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】 5.5 cm × 7.2 cm

製造販売元

 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

製造番号

使用期限