

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

温感

パスタイン[®]H

第3類
医薬品

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎0120-149-931

パスタインHはすぐれた鎮痛消炎効果を発揮するサリチル酸グリコール、*l*-メントールと温感効果を発揮するノニル酸ワニリルアミドを配合したプラスター剤です。

【特長】

- ジワジワとした温感作用が持続し、痛みやこりにすぐれた効果をしめします。
- 皮ふから吸収された有効成分が、痛みやこりをおさえます。
- 肌色で薄く、目立たないので人前でも安心です。
- ムレをおさえる気孔付きです。
- 伸縮性のある、肌にやさしいはり薬です。

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、皮ふはく離

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じることもあるので、入浴の30分以上前にはがしてください。また、入浴後にはる場合は30分位してからはってください。
- (4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (5) 皮ふの弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膏体100g中

サリチル酸グリコール……………6.4g
l-メントール……………1.9g
ノニル酸ワニリルアミド……………0.072g
添加物としてBHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他2成分を含有します。


【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

製造番号

使用期限

製造販売元

 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

【お客様相談窓口】TEL.0954-63-1320

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日は除く)