

第2類
医薬品

滋養強壯

TOPVITAN
トップビタン



15種類の
成分配合



TOPVITAN

FOR NUTRITION
AND INVIGORATION

服用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
成人 (15才以上)	1びん (50mL)	1日1回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。

[効能・効果]

●滋養強壯●虚弱体質●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

米田薬品株式会社
大阪市浪速区塩草3丁目2-2
お客様相談窓口 電話 06-6562-7411
受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

第2類医薬品

販売名:トップビタンW内服液

トップビタンW内服液は滋養強壯、肉体疲労時の栄養補給などに効果がある、辛味のあるドリンク剤です。ハンピ、ゴオウ、ローヤルゼリーなどの動物性生薬とニンジン、ジオウなどの植物性生薬にV.B1、V.B2、V.B6、V.Eなどのビタミンを配合してあります。

[成分・分量] 1びん(50mL)中
チアミン硝酸物……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム……………10mg
ピリドキシン塩酸塩……………20mg
ニコチン酸アミド……………20mg
パンテノール……………20mg
トコフェロール酢酸エステル……………20mg
無水カフェイン……………50mg
タウリン……………500mg
ローヤルゼリー……………100mg
ニンジン乾燥エキス……………90mg
ジオウ乾燥エキス……………60mg
セイヨウサンザシエキス……………10mg
ゴオウチンキ……………500μL
シベットチンキ……………500μL
ハンピチンキ……………200μL

(アルコール1.0mL以下)

添加物:安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、香料、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、エタノール、白糖、還元麦芽糖水アメ

<成分・分量に関連する注意>

●本剤の服用に際して、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収され、その一部が尿中に排泄されるためで心配はありません。

●生薬成分を配合しているため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありませんので、よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



TOPVITAN



OPEN