

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。


ものもらい・結膜炎の治療に

ロート 抗菌目薬 EX

眼科用薬・10mL

第2類医薬品

生後4ヶ月以上のお子さまにも



ものもらいは、身の回りにいる細菌がまぶたの脂腺などに入り込み、ハレや炎症を起こします。結膜炎は、細菌が結膜に感染して起こることが多く、白目が充血したり、目やにが多く出たりします。

目の表面にサルファ剤が 長くとどまる製剤設計。

「ロート抗菌目薬EX」は、細菌に対して強い抗菌力を持つサルファ剤を配合しています。そして、このサルファ剤を目の表面に長くとどめる粘稠剤ヒプロメロースを配合し、より高い抗菌効果を目指しました。さらに、ビタミンE配合で、抵抗力の低下した目の血行を促し、ものもらい・結膜炎の治療をサポートします。ものもらい・結膜炎をしっかりと治療したいときには「ロート抗菌目薬EX」。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

(2) 3～4日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

ものもらい、結膜炎(はやり目)、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)

用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、小さなお子さま(4ヶ月以上)にもご使用いただけます。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

容器の先と



目やまつ毛が
ふれること
ないように

有効成分

スルファメトキサゾールナトリウム…4.00% クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.02%
グリチルリチン酸二カリウム……………0.15% 酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)0.01%

添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ホウ砂、エドト酸Na、ヒプロメロース、ベンザルコニウム塩化物、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、過度の高温(自動車内や暖房器具の近く等)及び過度の低温(冷蔵庫の中等)を避け、なるべく涼しい所に保存してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、2～3ヶ月以内にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



※点眼により口中に苦味を感じるがありますが、薬液が涙道を通して流れでてくるため、無害ですから心配ありません。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京: **03-5442-6020** 大阪: **06-6758-1230**

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)