

*：2016年4月 通知により改訂

服用前にこの説明書を必ずお読みください。

また、必要なときに読めるよう保管してください。

ロートアルガード[®]鼻炎ソフトカプセルEX

鼻炎用内服薬

第2類医薬品

アレルギー性鼻炎などの鼻みず・くしゃみ・鼻づまりに効く!

ロートアルガード[®] 鼻炎ソフトカプセルEX

●塩酸プソイドエフェドリン+dl-メチルエフェドリン塩酸塩配合

ロートアルガード[®]鼻炎ソフトカプセルEXの特徴

花粉やハウスダストなどによるアレルギー性の鼻炎症状は大変つらいものです。不快症状が続くと、気分がすぐれず睡眠不足など日常生活にまで影響を及ぼしかねません。こんなときは、鼻みず、鼻づまりなどの鼻炎症状にすぐれた効き目のある「ロートアルガード[®]鼻炎ソフトカプセルEX」が効果的です。



使用上の注意 ⚠

●してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 次の症状のある人…………… 前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人…………… 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないでください。

●相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 授乳中の人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人
- (7) 次の症状のある人…………… 高熱、排尿困難、むくみ
- (8) 次の診断を受けた人…………… 緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤(セレギリン塩酸塩等)で治療を受けている人(セレギリン塩酸塩は、パーキンソン病の治療に用いられる)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ

4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) カプセルの取り出し方



成分・分量 (1日量：3カプセル中)

添加物：ポリソルベート80、
グリセリン脂肪酸エステル、
サラシミツロウ、中鎖脂肪酸
トリグリセリド、ゼラチン、

保管及び取扱上の注意

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

大阪市生野区巽西1-8-1