

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

アレルギー性鼻炎などによるくしゃみ・鼻みず・鼻づまりに… 鼻炎用内服薬 第2類医薬品

眠くなりにくい **アルガード®** クイックチュアブル
メキタジン配合

止めたいその時! クイック1錠

- Point 1** 水なしでいつでも飲める、口の中ですばやく溶けるチュアブルタイプ
- Point 2** さわやかなフレッシュメントール味ですーっとした服用感
- Point 3** 眠くなりにくい成分「メキタジン」配合で鼻炎症状に効果を発揮

処方の特徴

鼻みず・くしゃみ・鼻づまりなどの症状にすぐれた効果があります。



使用上の注意 ⚠

- **してはいけないこと** ☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー一用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
- 4. 長期連用しないでください。
- **相談すること**
- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人
(4) 高齢者 (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
(7) 次の診断を受けた人 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
血小板減少	血液中の成分である血小板の数が減ることにより、鼻血、歯ぐきからの出血、青あざ等の出血症状があらわれる。

- 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
- 4. 5~6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量

次の量を、かむか、口の中で溶かして服用してください。ただし、服用間隔を4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1錠	3回
15才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

(1)用法・用量を厳守してください。

成分・分量(1日量:3錠中)

有効成分	配合量
メキタジン	4.0mg
フェニレフリン塩酸塩	15.0mg
ペラドンナ総アルカロイド	0.4mg
無水カフェイン	90.0mg

添加物: D-マンニトール、酒石酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、メタケイ酸アルミン酸Mg、ℓ-メントール、スクラロース、ハッカ油、レモン油、オレンジ油

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところにキャップをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 濡れた手で触れないでください。(品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度内袋を開封した後は、なるべく早くご使用ください。

●お願い

服用の時は、ケースをイラストのように開け、1錠ずつ取り出してください。



お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに役立ちたい」サポートデスクです。
東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230
受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

オーテ製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1