

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

# 新エスタック「W」

第②類医薬品

かぜ薬 1日2回の持続性

- 新エスタック「W」は、効果が長く続くように工夫された持続性のかぜ薬ですから、1日2回（朝・夕食後）の服用ですぐれた効果をあらわします。
- 新エスタック「W」は、かぜの諸症状によく効きます。熱を下げ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをやわらげ、せきをしずめ、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状をおさえます。

## ⚠ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- ① 次の人には服用しないでください
  - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
 

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬、催眠鎮静薬等）
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 

（眠気等があらわれることがあります。）
- ④ 服用前後は飲酒しないでください
- ⑤ 長期連用しないでください



## 相談すること

- ① 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
  - (6) 次の診断を受けた人。心臓病、緑内障、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

(裏面につづく)

## (表面のつづき)

症状の名称	症 状
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
口のかわき、眠気
- ④ 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

かぜの諸症状(発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

次の1回量を1日2回、朝・夕食後に、水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	成人(15才以上)	7才～14才	7才未満
1回量	2カプセル	1カプセル	×服用しないこと

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方  
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。  
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



(PTPシートの取り出し図)

## 成 分 4カプセル(成人1日量)中

アセトアミノフェン・・・・・・・・・・480mg ノスカピン塩酸塩水和物・・・・・・・・・・20mg  
サリチルアミド・・・・・・・・・・400mg カフェイン水和物・・・・・・・・・・100mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩・・5mg アスコルビン酸(ビタミンC)・・・・・・・・100mg  
添加物：二酸化ケイ素、無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、フマル酸、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、シリコーン樹脂、タルク、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、ラウリル硫酸Na、エドト酸Ca/2Na、赤色3号、黄色5号、青色1号、青色2号

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)アルミ袋を開封後は、品質保持の点から開封日より3ヵ月以内に服用してください。  
なおPTPシート裏面のアルミ箔が破れたり、開封したまま置いておくと、湿気の影響により変色することがあります。変色したものは服用しないでください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
http://www.ssp.co.jp/