

1枚7cm×10cm
手のひらサイズ
32枚入
第2類医薬品

3.75%
インドメタジン

肩こりの痛み・腰痛・関節痛に
インサイドテープ

3.75%のインドメタジンが痛みのもと
(プロスタグランジンの発生)を直接抑えます。

開け口

第2類
医薬品

肩こりの痛み・腰痛・関節痛に
インサイドテープ 32枚入(1枚:7cm×10cm)

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。
- 次の部位には使用しないでください
(1)目の周囲、粘膜等。
(2)湿疹、かぶれ、傷口。
(3)みずみずしい、むしむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感


- 5~6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

使用期限

エスエス製薬株式会社
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4
http://www.ssp.co.jp/

上手な貼り方



■用法・用量

表面のプラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)11才未満の小児には使用させないでください。
- (3)11才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (5)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (6)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かしてから使用してください。
- (7)皮膚の特に弱い人は、同じ箇所には続けて貼らないでください。

■効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

副作用被害救済制度 ☎0120-149-831



(21)

紙

(R)登録商標

お問い合わせ先: お困りごとのお問い合わせ先、又はお薬情報センターにお問い合わせてください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-0208-199
受付時間: 9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

肩こりの痛み・腰痛・関節痛に
インサイドテープ

32枚入
手のひらサイズ
1枚7cm×10cm
第2類
医薬品

1

121001A

インサイドテープ
インドメタジン
3.75%配合



肩こりの痛み・腰痛・関節痛に

インドメタジンが
痛みのもとに
直接効く

32枚入
手のひらサイズ
1枚
7cm×10cm

エスエス製薬

第2類
医薬品

■保存及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)品質維持のため、開封後は袋の口を折り返し、外気にふれないようにして保管してください。(5)使用期限をすぎたものは使用しないでください。

■成分 膏体100g(10,000cm²)中
インドメタジン.....3.75g(3.75%)
添加剤: エステルガム、脂肪酸酸和酸化チタン、流動パラフィン、マクロゴール、ミリスチチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、0-メーントール、その他2成分

32K708114

肩こりの痛み・腰痛・関節痛に
インサイドテープ
インドメタジン
3.75%配合
32枚入
手のひらサイズ
1枚7cm×10cm
第2類医薬品

C003