

【この説明書は、本剤とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。】

第2類医薬品

# エスタック<sup>®</sup>漢方「葛根湯」エキス顆粒

漢方製剤 満量処方 かぜのひきはじめ・鼻かぜ・頭痛・肩こりに

- エスタック漢方<sup>かつこんとう</sup>「葛根湯」エキス顆粒は、漢方薬・葛根湯のエキスをのみやすい顆粒剤としたものです。
- 葛根湯は中国の医学書の古典「傷寒論<sup>しょうかんろん</sup>」および「金匱要略<sup>きんきやうりやく</sup>」に記載されている漢方処方<sup>じやう</sup>で、かぜをひいて、首すじから肩にかけてこりや痛みがあり、汗がなく発熱や悪寒(ゾクゾクするさむけ)などを訴えるいわゆるかぜのひきはじめや鼻かぜ・頭痛あるいは筋肉痛にすぐれた効きめをあらわします。
- 眠くなる成分は含んでいません。

## ⚠ 使用上の注意

**⊗ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

- ① 次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。 むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

- (2) 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合。

- ③ 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

## 効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

## 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用します。

年齢	成人(15才以上)	7才～14才	4才～6才	2才～3才	2才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分 3包(成人1日量：9.0g)中

葛根湯水製乾燥エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.0g

カッコン	8.0g
ケイヒ	3.0g
マオウ	4.0g
シャクヤク	3.0g
タイソウ	4.0g
ショウキョウ	1.0g
カンゾウ	2.0g
上記生薬より抽出したエキス	

添加物として、乳糖、ステアリン酸Mgを含有します。

- 本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。薬効には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



### お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。  
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193  
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

発売元  
**エスエス製薬株式会社**  
〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4  
<http://www.ssp.co.jp/>

製造販売元  
**株式会社カーヤ**  
大阪府吹田市垂水町3-4-11

製造元  
**天津泰達薬業有限公司**  
中国 天津市