


服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。



胃の痛み・もたれ、胃炎に〈微粒〉

# 大正胃腸薬K

第2類医薬品

〈胃腸薬〉

- ◆大正胃腸薬Kは、芍薬甘草湯エキス末と、安中散を配合した胃腸薬です。
- ◆これらの2種類の処方配合した大正胃腸薬Kは、胃の痛みや胃もたれ、胃炎をはじめとする胃腸の諸症状の改善に効果があります。



## 使用上の注意



### 相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 高齢者。  
(3) 次の症状のある人。  
むくみ  
(4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、腎臓病、心臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の  
可能性があるため、直ちに服用を中止し、この  
説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合は医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能

胃痛、胃のもたれ、胃炎、胃部不快感、食欲不振、げっぷ、腹痛、胸やけ、はきけ、胃酸過多、腹部膨満感

こんな時に



胃痛、胃炎



胃のもたれ、胃部不快感



食欲不振、げっぷ

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	1包 	1日3回
5~14才	1/2包 	
5才未満	服用しないこと	

### [注意]

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

食間の服用は、食事の後2~3時間を目安にします

# 成分

1包(1.2g)中

成分	分量	はたらき
安中散 (下記生薬の混合粉末) ケイヒ(桂皮) エンゴサク(延胡索) ボレイ(牡蠣) ウイキョウ(茴香) シュクシャ(縮砂) カンゾウ(甘草) リョウキョウ(良姜)	700mg  200mg 150mg 150mg 75mg 50mg 50mg 25mg	衰えた胃腸のはたらきを活発にする作用があり、胃のもたれ、胃部不快感、胃炎等の症状を改善します。  
芍薬甘草湯エキス末 (下記生薬の抽出乾燥エキス末) シャクヤク(芍薬) カンゾウ(甘草)	170mg  340mg 340mg	胃腸の筋肉の異常な緊張をやわらげる作用があり、胃痛や腹痛等をしずめます。  

添加物：無水ケイ酸、バレイシヨデンブ、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク

[注意] 本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



## 治療のポイント

本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意ください。



暴飲暴食に注意し、三度の食事を規則正しくとり、生活リズムを一定に保ちましょう。



タバコ、アルコール類、コーヒー等の嗜好品を取りすぎないようにしましょう。



現代の複雑な社会ではストレスはさげられません。ストレスをため込まないよう上手な解消法を見つけましょう。



規則正しい生活を心がけましょう。夜ふかしや睡眠不足は胃を荒らす原因になります。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室

**電話** 03-3985-1800

**受付時間** 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<http://www.taisho.co.jp>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)