

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



デリケート部位のかゆみ、かぶれに

デリトリーナ

第2類医薬品

〈鎮痒消炎薬〉

- ◆デリトリーナは、デリケート部位のかゆみに効く治療薬です。
- ◆6種類の有効成分が、かゆみをはやく鎮め、かぶれたお肌を改善していきます。
- ◆爽やかな清涼感で、べたつかず、のびのよい非ステロイド系のクリームです。



使用上の注意

相談すること



① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 医師の治療を受けている人。
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 湿潤やただれのひどい人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

③ 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

かゆみ、かぶれ、湿疹、皮膚炎、じんましん、あせも、ただれ、虫さされ、しもやけ

こんな時に

生理時のかゆみに



下着、ストッキングの
むれによるかゆみに



おりものや
汗によるかゆみに



用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

[注意]

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成 分

100g中

成 分	分 量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみを鎮めます。
リドカイン	2.0g	局所麻酔作用でかゆみをやわらげます。
グリチルレチン酸	1.0g	患部の炎症を鎮めます。
トコフェロール酢酸エステル (ビタミンE)	0.5g	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用で、雑菌の繁殖を抑えます。
l-メントール	0.5g	爽やかな清涼感でかゆみをやわらげます。

添加物：ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ミリストン酸オクチルドデシル、イソステアリン酸、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、1,3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、パラベン

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。
(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)